

Rökstopp och levnadsvanor

Metformin	Metformin	Metformin	Metformin	Metformin	Metformin
Fetma	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)*	Mest sjuka äldre	Övriga Behandling individualiseras
<p>GLP-1-RA Dulaglutid (Trulicity)</p> <p>Liraglutid (Victoza)</p> <p>Semaglutid (Ozempic)</p> <p>HbA1c-sänkning 10–15 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 3–4 kg</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Gastrointestinala bieffekter</p> <p>SGLT-2-hämmare Dapagliflozin (Forxiga)</p> <p>Empagliflozin (Jardiance)</p> <p>HbA1c-sänkning 7–10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2–3 kg</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p>	<p>SGLT-2-hämmare Dapagliflozin (Forxiga)</p> <p>Empagliflozin (Jardiance)</p> <p>HbA1c-sänkning 7–10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2–3 kg</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p> <p>GLP-1-RA Dulaglutid (Trulicity)</p> <p>Liraglutid (Victoza)</p> <p>Semaglutid (Ozempic)</p> <p>HbA1c-sänkning 10–15 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 3–4 kg</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Gastrointestinala bieffekter</p>	<p>SGLT-2-hämmare Dapagliflozin (Forxiga)</p> <p>Empagliflozin (Jardiance)</p> <p>HbA1c-sänkning 7–10 mmol/mol</p> <p>Viktnedgång 2–3 kg</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Risk för urogenital infektion, ketoacidosis</p>	<p>DPP-4-hämmare Linagliptin (Trajenta)</p> <p>HbA1c-sänkning 6–8 mmol/mol</p> <p>Viktneutralt</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Meglitinid Repaglinid (Repaglinid)</p> <p>lakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) och vid behov trappa upp dosen försiktigt.</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång.</p> <p>Insulin Insulin human (Insuman Basal)</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>	<p>DPP-4-hämmare Linagliptin (Trajenta)</p> <p>HbA1c-sänkning 6–8 mmol/mol</p> <p>Viktneutralt</p> <p>Låg hypoglykemisk</p> <p>Insulin Insulin human (Insuman Basal)</p> <p>Risk för hypoglykemi och viktuppgång</p>	<p>DPP-4-hämmare Behov måttlig effekt, viktneutralitet, ej hypoglykemi</p> <p>GLP-1-RA Behov uttalad effekt, vikt-nedgång, ej hypoglykemi</p> <p>Insulin NPH Behov upptitreringsbar effekt Risk hypoglykemi, vikt-uppgång</p> <p>Meglitinid (Repaglinid) Kan ges vid låg risk för hypoglykemi Viktuppgång</p> <p>SGLT-2-hämmare Behov måttlig effekt, vikt-nedgång, ej hypoglykemi</p> <p>SU (Glimepirid, glipizid) Kan ges vid låg risk för hypoglykemi Viktuppgång</p> <p>Tiazolidindioner (Pioglitazon) Vid uttalad insulinresistens</p>

* Läke-medelsverkets behandlingsrekommendation 4:2017, tabell VII.

** Alla snabbverkande insuliner är likvärdiga och av kostnadsskäl väljs det billigaste alternativet vid nyinsättning och receptförnyelse.

Insulin

Basinsulin
Snabbverkande insulin

Insuman Basal
Insulin aspart Sanofi** (biosimilar till NovoRapid)