

Rekommenderade läkemedel för barn – ny upplaga för 2019-2020

Nya kapitel

Influenza

Detta kapitel ger rekommendationer kring profylax och behandling av influensa främst ur ett primärvårdsperspektiv. Rekommendationerna bygger på Läke-medelsverkets behandlingsrekommendation.

Riklig menstruation

För behandling av riklig menstruation rekommenderas tranexamsyra.

D-vitaminbrist

Detta kapitel ger rekommendationer kring profylax och behandling av D-vitaminbrist och bygger både på rekommendationer från Barnläkarförningens delförening för endokrinologi och diabetes samt Livsmedelsverket.

Ändrade rekommendationer och tillägg

Impetigo

Retapamulin (Altargo) har utgått från marknaden. Denna ersätts av fusidinsyra. P.g.a. risken för resistensutveckling betonas vikten av lokal rengöring än mer.

Perianal streptokockinfektion ("stjärtfluss")

Cefadroxil ersätter fenoximetylpenicillin som förstahandsval. I den enda kliniska prövning som har jämfört preparaten uppvisade ett cefalosporinpreparat bättre effekt.

Urinvägsinfektioner

Rekommendationerna har harmoniserats med de från Svensk barnnefrologisk förening.

Atopiskt eksem

Lokalbehandling med kalcineurinhämmare har lagts till som en möjlig behandling vid eksem i ansikte, hals eller i känsliga hudveck då grupp I-steroid har otillräcklig effekt.

Akne

Tillägg att kombinerade hormonella medel kan vara ett alternativ hos de med behov av antikonception.

Krupp

Dosen av betametason justeras ned från 0,5 mg/kg till 0,15 mg/kg. Det finns viss evidens från studier samt god klinisk erfarenhet av att detta är tillräckligt.

Generella förändringar

I de fall en dosrekommendation anges baserat på kroppsvikt anges samtidigt rekommenderad maximal dygnsdos.